GUÍA PARA EL PACIENTE

Después de reparar el manguito rotador

Artroscopia de hombro con reparación del manguito rotador

72 VENDAJE E INCISIONES

- Mantenga el vendaje original limpio y seco durante 72 horas.
- Después de 72 horas, retire el vendaje, coloque curitas limpias sobre las heridas y manténgalas limpias y secas.
- No sumerja las heridas ni nade hasta que hayan cicatrizado y reciba autorización.

Rx MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR

- Use Percocet (narcótico) solamente según lo recetado para el dolor intenso.
- Use el AINE recetado para el dolor moderado o leve. Tómelo con alimentos, a menos que le indiquen lo contrario.
- No conduzca, beba alcohol ni tome decisiones importantes mientras use Percocet. No añada acetaminofén adicional sin aprobación clínica.

C PROTEJA LA REPARACIÓN

- Use el cabestrillo continuamente, incluso al dormir, excepto para la higiene y los ejercicios aprobados.
- No levante activamente el brazo operado. No levante, empuje, jale ni alcance objetos con ese brazo.
- Sostenga el brazo al vestirse y bañarse. Siga cualquier restricción adicional de su cirujano.

ROM MOVIMIENTO SEGURO

- Mueva suavemente los dedos y la muñeca varias veces al día.
- Doble y estire el codo solamente según las indicaciones, manteniendo apoyada la parte superior del brazo.
- No comience ejercicios del hombro salvo indicación específica.

2W Seguimiento: Regrese en aproximadamente 2 semanas para evaluar la herida, retirar las suturas y comenzar fisioterapia o terapia de la mano según las indicaciones.

! Llame pronto a Motion Orthopedics si presenta:

- Fiebre superior a 101.5 °F, aumento del enrojecimiento, calor, secreción o mal olor.
- Dolor o hinchazón que empeora rápidamente o no se controla con el medicamento.
- Entumecimiento persistente nuevo, cambio de color o frialdad inusual de la extremidad operada.
- Dolor de pecho, falta de aire o dolor/hinchazón en la pantorrilla: busque atención urgente.

¿Preguntas? Llame al 212-355-5555